



## Svjetski dan sepsse - 13. rujna Jedan dan - jedna vizija - cjelogodišnji trud

### Uočite dječju sepsu

Svako dijete sa sumnjom na infekciju s groznicom ( $>38^{\circ}\text{C}$ ) ili hipo termijom ( $<36^{\circ}\text{C}$ ) koje ima nešto od slijedećeg...

- Abnormalno ponašanje ili poremećaj svijesti
- Ubrzan ili slabo opipljiv puls
- Mramorizirani ili hladni ekstremiteti
- Teški respiratorni poremećaj
- ubrzano kapilarno punjenje ili prolongirano kapilarno punjenje ( $>3$  sek)
- Udarni periferni puls
- Smanjeno izlučivanje urina ( $<1\text{ml/kg/h}$ )

...može imati sepsu.

Mortalitet raste sa svakim satom.



Global  
Sepsis  
Alliance



## Svjetski dan sepse - 13. rujna Jedan dan - jedna vizija - cjelogodišnji trud

LJЕЋITE DJЕЋU SEPSU KAO HITNO STANJE – UNUTAR 1 SATA

- Intraosalni ili vaskularni put
- Hemokulture (IV/IO) - *osim ukoliko ne odgađa primjenu antibiotika*
- Antibiotik širokog spektra IV/IO
- Izmjerite laktate
- Bolus tekućine od 10-20ml/kg izotoničnog kristaloida kroz 30 - 60 minuta
- Ukoliko se perfuzija ne poboljša, razmislite ponavljanje do max 60ml/kg
- Procijena nakon svakog bolusa, zasutaviti zbog edema pluća ili hepatomegalije
- Dati visoke protoke kisika, cilj SpO<sub>2</sub> >95% (*moguća je intubacija*)

Ukoliko šok ne reagira na tekućinu, dozirajte epinephrina (0.05-0.3 µg/kg/min) i potražite stručnu pomoć.

Ciljevi:

- Kapilarno punjenje ≤ 2 sec
- Diureza > 1ml/kg/h
- Fiziološki puls
- Uredan mentalni status
- Uredan srčani ritam

Ukoliko dijete ostane u šoku, započnite transport u ustanovu sa iskustvom u tretiranju septičkog šoka.



Global  
Sepsis  
Alliance