



## Svjetski dan sepse - 13. rujna Jedan dan - jedna vizija - cjelogodišnji trud

UočITE SEPSU NOVOROĐENČADI

Svako novorođenče sa sumnjom na infekciju s groznicom ( $>38^{\circ}\text{C}$ ) ili hipotermijom ( $<36^{\circ}\text{C}$ ) koje ima nešto od [slijedećeg...](#)

- Abnormalno ponašanje
- Ubrzan ili slabo opipljiv puls
- Mramorizirani ili hladni ekstremiteti
- Broj respiracija ( $>60$ ) ili teški respiratorni poremećaj
- Konvulzije ili ispupčena fontanela
- Slabo uzimanje hrane ili izostanak sisanja
- Proljev

...može imati sepsu.

**Djelujte brzo kod sumnje na sepsu.  
Mortalitet raste sa svakim satom.**



Global  
Sepsis  
Alliance



## Svjetski dan sepse - 13. rujna Jedan dan - jedna vizija - cjelogodišnji trud

TRETIRAJTE SEPSU NOVOROĐENČADI KAO HITNO STANJE - **unutar jednog sata**

- Intraosalni ili vaskularni put
- Hemokulture (IV/IO) - samo ako ne odgađaju primjenu antibiotika
- Antibiotik širokog spektra IV/IO
- Izmjerite laktate
- Bolusi tekućine 10-20 mL/kg izotoničnog kristaloida kroz 30 - 60 minuta
- Ako se perfuzija ne poboljša, razmotrite ponavljanje do maksimalno 40 mL/kg
- Ponovna procjena nakon svakog bolusa, zaustaviti kod edema pluća ili hepatomegalije
- Dati visoke protoke kisika, cilj SpO<sub>2</sub> > 95%

---

Ako šok ne reagira na tekućine, dozirajte epinefrin (0,05 - 0,3 µg/kg/min) i potražite stručnu pomoć.

---

Ciljevi:

- Kapilarno punjenje ≤ 2 sekunde
- Diureza > 1 mL/kg/h
- Fiziološki puls
- Uredan mentalni status
- Uredan srčani ritam

Ako novorođenče ostane u šoku, započnite transport u ustanovu sa iskustvom u tretiranju septičkog šoka.



Global  
Sepsis  
Alliance