



## Svjetski dan sepse - 13. rujna Jedan dan - jedna vizija - cjelogodišnji trud

### Uočite SEPSU U TRUDNICA I RODIŁA

Sepsa je definirana kao po život opasna disfunkcija organa uzrokovana neadekvatnim odgovorom domaćina na infekciju.

Razmotrite mogućnost sepse kod svake žene koja je trudna ili unutar 14 dana od poroda ima suspektnu ili potvrđenu infekciju i doima se loše, uključujući pacijente sa SARS-CoV-2. Rani upozoravajući znakovi mogu biti korisni u identifikaciji lošijih pacijenta.

Standardna definicija sepse bazirana je na ocjeni sekvenčalne procjene zatajenja organa (SOFA). SOFA varijable:

- PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> omjer
- Serumski kreatinin ili količina urina
- Bilirubin
- Srednji arterijski tlak (MAP)
- Razina trombocita
- Glasgow koma skala (GCS)
- Primjena vazopresora i  
učestalost doziranja

**SOFA SCORE** ≥ 2 u okruženju infekcije snažno podržava dijagnozu sepse

**SEPTIC SHOCK:** Vazopresori moraju održavati MAP ≥ 65mmHg i razinu laktata u serumu ≥ 2 mmol/L (18mg/dL) bez obzira na volumnu nadoknadu

Reagirajte brzo kada postoji sumnja na sepsu. Mortalitet raste svakim satom.



Global  
Sepsis  
Alliance



## Svjetski dan sepse - 13. rujna Jedan dan - jedna vizija - cjelogodišnji trud

Liječite trudnice i rodiče oboljele od sepsa kao hitno stanje – UNUTAR 1 SATA

- Mjerite razinu laktata, ponovite mjerjenje ako je inicijalna razina laktata  $\geq 2 \text{ mmol/L}$
- Uzmite uzorak krvi za hemokulturu prije davanja antibiotika
- Primjenite antibiotike širokog spektra
- Započnite brzu primjenu 20 mL/kg kristaloida za hipotenziju ili kod razine laktata  $\geq 4 \text{ mmol/L}$
- Intervencija na kontroli uzroka, uključujući razmatranje trenutka poroda – *čim je prije moguće*

### AKO ŠOK NE REAGIRA NA BOLUSE TEKUĆINE

- Započnite terapiju vazopresorima - MAP cilj  $\geq 65 \text{ mmHg}$
- Norepinefrin je prvi izbor za vazopresore
- Vazopresin ili epinefrin može biti dodan ako norepinefrin ne dosegne ciljani srednji arterijski talk

### AKO ŠOK NE REAGIRA NA VAZOPRESORE, ZAPOČNITE PRESELJENJE U USTANOVU SA ISKUSTVOM U TRETIRANJU SEPTIČKOG ŠOKA.

Reagirajte brzo kada postoji sumnja na sepsu. Mortalitet raste svakim satom.



Global  
Sepsis  
Alliance